

Tabela 1. Zalecenia stosowania środków ochrony roślin przed chorobami występującymi w uprawie truskawek

Choroba	Sugerowany środek ochrony roślin	Dawka na ha	Klasa toksyczności	Karencja w dniach	Uwagi
Biała plamistość liści truskawki	Domark 100 EC – IP	0,6 l	Szkodliwe dla ludzi	7	Opryskiwać plantacje odmian, na których występują objawy chorób. Nowoz założone plantacje opryskiwać po posadzeniu lub wczesną wiosną. Plantacje owocujące, w zależności od potrzeby, opryskiwać przed kwitnieniem, po kwitnieniu lub po zbiorach. Koszenie liści wykonać tylko na plantacjach będących w dobrej kondycji, najpóźniej 2 tygodnie po zbiorze. ⁰ ogranicza nasilenie choroby ¹ Na plantacjach, na których prowadzone jest biologiczne zwalczanie przędziorków ograniczyć stosowanie środka do 1-3 zabiegów w sezonie i nie bezpośrednio po sobie.
	Sadoplone 75 WP – IP ^{0 1}	4-5kg		7	
	Signum 33 WG – IP	1,8 kg		3	
	Zato 50 WG – IP	0,25 kg		3	
Mączniak prawdziwy truskawki	Domark 100 EC – IP	0,6 l	Szkodliwe dla ludzi	7	Opryskiwać podatne odmiany przed kwitnieniem, jeśli występują objawy choroby. Dalsze zabiegi po kwitnieniu, 2-3 razy i po zbiorach, 1-2 razy. Domark 100 EC, Signum WG i Zato 50 WG nie stosować częściej niż 2 razy w sezonie. Domark 100 EC stosować w temperaturze powyżej 12 °C
	Nimrod 350 EC – IP	1,5-2,5 l		14	
	Signum 33 WG – IP	1,8 kg		3	
	Zato 50 WG - IP	0,25 kg		3	
Szara pleśń	Mythos 300 SC – IP**	2,5 l	Szkodliwe dla ludzi	7	Opryskiwać od początku kwitnienia co 5-7 dni w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych. * - zabiegi środkiem Polyversum WP rozpocząć od początku wegetacji. Sadoplone 75WP nie stosować od ostatniego zabiegu ** - nie stosować częściej niż 2 razy w sezonie. Teldor 500 SC stosować tuż przed i pomiędzy zbiorami, jeśli istnieje taka konieczność.
	Polyversum WP – IP *	100 g			
	Pomarsol Forte 80 WG – IP ¹	4 kg		7	
	Sadoplone 75 WP – IP ¹	4-5 kg		7	
	Signum 33 WG – IP	1,8 kg		3	
					¹ W sadach, w których prowadzone jest biologiczne zwalczanie przędziorków ograniczyć stosowanie

	Switch 62,5 WG - IP**	0,8-1 kg		3	środka do 1-3 zabiegów w sezonie i nie bezpośrednio po sobie.
	Teldor 500 SC – IP**	1,5		1	
	Thiram Granuflo 80 WG - IP ¹	4 kg		7	

IP - Środek zalecany do stosowania w integrowanej produkcji

źródło: Instytut Ochrony Roślin –Państwowy Instytut Badawczy