



Grypa ptaków – bioasekuracja

Choroba może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Rozprzestrzenia się wraz z migrującymi dzikimi ptakami, przede wszystkim wodnymi, jak kaczki, gęsi i łabędzie. Może być przenoszona bezpośrednio z ptaka na ptaka lub pośrednio poprzez zanieczyszczoną wodę, paszę, ściółkę czy kał dzikich ptaków wniesiony na obuwiu lub odzieży.

Patrz rys. 1

Choroba jest zwalczana z urzędu. W przypadku podejrzenia jej wystąpienia, hodowca ma obowiązek zgłosić to do inspekcji weterynaryjnej. Potwierdzenie choroby oznacza eutanazję wszystkich ptaków w ognisku, utylizację zwierząt i pomiotu oraz dezynfekcję obiektów. To także wyznaczenie obszarów zapowietrzonego (w promieniu 3 km od miejsca wystąpienia choroby) i zagrożonego (w promieniu 10 km), na 21 dni.

Okres inkubacji wynosi około 3–14 dni, ale

trzony i zagrożony są wyznaczane na 21 dni przyjmowane, jako maksymalny czas inkubacji. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny może zdecydować o eutanazji wszystkich ptaków na obszarze zapowietrzonego.

Wirus dostaje się do organizmu ptaka za pośrednictwem układu oddechowego i pokarmowego, a także poprzez spojówki i błonę śluzową steku. Objawy są niespecyficzne i zależą od różnych czynników (podtypu wirusa, gatunku ptaka, wieku, kondycji, sprawności układu odpornościowego itp.).

Różne objawy, mogące towarzyszyć grypie ptaków, zostały przedstawione na schemacie.

Patrz rys. 2

Należą do nich zwiększone upadki, spadek pobrania paszy, nieśności, znoszenie jaj bez skorupki (tzw. łanie jaj), objawy ze strony układu oddechowego, nerwowego (porażenia, skręt szyi, drżenia głowy, chwiejny chód), obrzęki i zasinienia w ob-

Choroba może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Rozprzestrzenia się wraz z migrującymi dzikimi ptakami, przede wszystkim wodnymi, jak kaczki, gęsi i łabędzie. Może być przenoszona bezpośrednio z ptaka na ptaka lub pośrednio poprzez zanieczyszczoną wodę, paszę, ściółkę czy kał dzikich ptaków wniesiony na obuwiu lub odzieży.

Choroba jest zwalczana z urzędu. W przypadku podejrzenia jej wystąpienia, hodowca ma obowiązek zgłosić to do inspekcji weterynaryjnej. Potwierdzenie

choroby oznacza eutanazję wszystkich ptaków w ognisku, utylizację zwierząt i pomiotu oraz dezynfekcję obiektów. To także wyznaczenie obszarów zapowietrzonego (w promieniu 3 km od miejsca wystąpienia choroby) i zagrożonego (w promieniu 10 km), na 21 dni.

Plik do pobrania: [grypaptakowbioasekuracja2022.pdf](#) | pdf, 323.63 Kb |

Pobierz

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

Data publikacji

30.06.2022

[Wszystkie publikacje](#)