



Wczesnowiosenne pożytki pszczele

Z początkiem kwitnienia pierwszych roślin pożytkowych, pszczoły przystępują do zbioru pyłku i nektaru. Sezon rozpoczynają kwitnące narcyzy, klony czy brzozy. W okresie wiosennego rozwoju następuje wymiana pszczół, stopniowo giną zimujące, a ich miejsce zajmują młode.

Odmladzanie się składu rodziny zależy od:

- zasobności gniazda w pokarm, zwłaszcza pyłkowy (białko) gwarantujący rozwój i funkcjonowanie gruczołów gardzielowych karmielek,
- dopływu wody niezbędnej do sporządzania papki miodowo-pyłkowej,
- wielkością gniazda dostosowaną do siły rodziny tak, by pszczoły mogły ogrzać wychowywany czerw.

Wybrane pożytki wczesnowiosenne

Narcyz (*Narcissus* L.) – rodzaj roślin należący do rodziny amarylkowatych. Dostarczają one cennego wczesnowiosennego pożytku w postaci pyłku i nektaru dla owadów zapylających.

Klon (*Acer* L.) – rodzaj roślin z rodziny mydleńcowatych. Do rodzaju należy około 100 gatun-

ków drzewiastych i krzewiastych. Gatunkiem typowym jest klon jawor.

Brzoza (*Betula* L.) – rodzaj drzew i krzewów należący do rodziny brzoźowatych. Wyróżnia się ok. 30–60 gatunków.

Patrz tabela 1

Następne pożytki pszczele:

- wiosenne,
- wczesnoletnie,
- letnie,
- późnoletnie,
- jesienne.

W Polsce występuje ponad 3 tysiące gatunków roślin, z których owady pozyskują nektar lub pyłek. Bez odpowiedniej bazy pożytkowej, rodziny pszczele, nawet te najsilniejsze, nie będą mogły się rozwijać, a my nie uzyskamy miodu z wyprodukowanej przez nie nadwyżki. Najlepszą sytuacją dla pszczelarza i jego pszczół jest różnorodność i ciągłość bazy pożytkowej w okolicy.

Jeśli występuje okres bez pożytku, zatrzymuje się rozwój rodziny pszczelej. Wyjściem jest przewożenie pasieki do miejsc, gdzie

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

Data publikacji

31.03.2023

[Wszystkie publikacje](#)